



COLECCIÓN ORNITOLÓGICA

Luis Gonzalo Andrade Trujillo
Clara Marcela Gómez
Gerson Peñuela Díaz



El ancestro de las aves, el Archeopterys, vivió durante el Jurásico superior hasta el Cretácico. A partir de este se identifica el primer ser que se pueda comparar con las aves actuales. Las aves son vertebrados endotérmicos, caracterizados por tener plumas, pico y las extremidades anteriores modificadas como alas para el vuelo. Se reproducen mediante huevos que incuban hasta la eclosión (Ovíparas).

En la actualidad se calcula que existen 9.200 especies repartidas en 29 órdenes y 180 familias (Ferrero & Lentito, 1992); la avifauna colombiana es la más diversa del mundo y representa aproximadamente el 19% de las especies de aves del mundo (Hernández-Camacho, 1993), con 1.815 especies presentes. Debido a la destrucción, fragmentación, transformación del hábitat y la caza, un creciente número de especies se han extinguido.

En un mundo en el que hay especies de aves amenazadas por la extinción, la educación ha de ser una de las bases fundamentales para asegurar una rica y abundante diversidad ornitológica; de ahí el indudable papel del Museo de Historia Natural "Luis Gonzalo Andrade" de la UPTC, en el que reposan ejemplares de los departamentos de Boyacá, Santander y Casanare, y se pueden apreciar datos ecológicos y morfológicos de gran importancia. La colección ornitológica del museo cuenta con 18 órdenes repartidos en 51 familias, entre las que se destacan especies como el Gallito de Roca (*Rupicola peruviana*) de hermoso y variado color, el Cóndor de los Andes (*Vultur gryphus*), considerada el ave voladora más grande del mundo y emblema de nuestro país, y el Gavilán Caminero (*Buteo magnirostris*), primer ejemplar que ingresó a la colección de exhibición del Museo de Historia Natural "Luis Gonzalo Andrade", el cual fue montado por el fundador en el año 1961.

Las descripciones de cada una de las especies que se encuentran a continuación, se basaron en los datos de campo del primer autor de este capítulo, así como en los datos anotados en el libro de Hilty & Brown, 2001.



ORDEN PODICEPEDIFORMES



Familia: Podicipedidae

Género: Podilymbus

Especie: *Podilymbus podiceps*

Nombre Común: Pato Zambullidor

Descripción: longitud 30 centímetros. Pico puntado con una banda negra. Ojos oscuros, el plumaje del cuerpo es café grisáceo, más pálido en el abdomen y los flancos. Garganta negra y patas lobuladas.

Hábitat: residente en lagos y lagunas de agua dulce.

Distribución: en Colombia lo encontramos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Magdalena y Valle del Cauca.



ORDEN PELECANIFORMES



Familia: Pelecanidae

Género: *Pelecanus*

Especie: *Pelecanus occidentalis*

Nombre Común: Pelicano

Descripción: longitud entre 114 y 137 centímetros, con apariencia de una joroba. Pico largo, con bolsa gular. Plumaje principalmente gris por encima; cuello y partes inferiores cafés. Los adultos tienen la cabeza blanca, y listas de igual color a los lados del cuello.

Hábitat: común en aguas costeras.

Distribución: en Colombia se encuentra en playas del Mar Caribe y del Pacífico.



Familia: Phalacrocoracidae
Género: *Phalacrocorax*
Especie: *Phalacrocorax olivaceus*
Nombre Común: Cormorán.

Descripción: longitud entre 64 y 71 centímetros. Pico negro, largo y delgado con un gancho en el extremo, bolsa gular, Patas negras, plumaje negro aceitoso, piel facial desnuda de color rosado.

Hábitat: común en lagos de agua dulce y ríos; anidan en manglares.

Distribución: en Colombia habita en toda la Costa Atlántica y Pacífica.



Familia: Phalacrocoracidae

Género: *Anhinga*

Especie: *Anhinga anhinga*

Nombre Común: Pato Aguja

Descripción: longitud entre 81 y 91 centímetros. Pico largo puntiagudo, cabeza pequeña, cuello largo y delgado, cola larga en forma de abanico; el macho presenta numerosos puntos y bandas grises-plata en las alas.

Hábitat: es común verlo en ríos y arroyos, ocasionalmente en aguas salobres.

Distribución: en Colombia, en la zona tropical de todo el territorio nacional.



ORDEN ANSERIFORMES



Familia: Anatidae

Género: *Amazonetta*


Especie: *Amazonetta brasiliensis*

Nombre Común: Pato Yaguaso

Descripción: longitud entre 36 y 41 centímetros. Pico y patas anaranjados, plumaje de color café; coronilla, nuca y cola negros; mejillas y lados del cuello blanco. Las alas son de color verde y azul brillante con un parche blanco.

Hábitat: en pantanos, estanques, y campos inundados.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.



Familia: Anatidae
Género: *Dendrocygna*
Especie: *Dendrocygna autumnalis*
Nombre Común: Pato Pisingo

Descripción: longitud entre 51 y 56 centímetros. Pico anaranjado, patas largas naranjas. Dorso, región ventral, lados de la cabeza, alto del cuello y pecho café grisáceo; vientre negro.

Hábitat: lagunas y pantanos de agua dulce, campos inundados, y ocasionalmente en aguas salobres y manglares.

Distribución: en Colombia se encuentra en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Meta y Vaupés.



Familia: Anhimidae

Género: *Chauna*

Especie: *Chauna chavarría*

Nombre Común: Chavarria

Descripción: longitud 79 centímetros. Grande y robusta. Coronilla y cresta occipital de color gris, garganta y lados de la cabeza de color blanco, cuello negro. Patas rojas y resto del cuerpo negro. En cada ala presenta dos espolones, uno más grande que el otro, los que utiliza para la reproducción.

Hábitat: vive en pantanos y lagunas con abundante vegetación, en terrenos abiertos y boscosos.

Distribución: en Colombia se encuentra en los departamentos de Cesar, Córdoba y Magdalena.



ORDEN PHOENICOPTERIFORMES



Familia: Phoenicopteridae

Género: *Phoenicopterus*

Especie: *Phoenicopterus ruber*

Nombre Común: Flamenco Común

Descripción: longitud entre 102 y 122 centímetros. Pico rosado y doblado, con ápice negro; patas largas y rosadas. Plumas de color rosado con el extremo de las alas negras.

Hábitat: en lagunas de agua dulce y salobre.

Distribución: en Colombia se encuentra en los departamentos de Guajira y Magdalena.



ORDEN CICONIFORMES



Familia: Ardeidae

Género: *Casmerodius*

Especie: *Casmerodius albus*

Nombre Común: Garza Blanca Real

Descripción: longitud 101 centímetros. Es la más grande de las garzas totalmente blancas y de cuello más largo. Tiene el pico amarillo y las patas negras. El iris es amarillo claro. Las otras garzas blancas difieren por el color de las patas o el pico. Son distintivos de esta especie los aletazos lentos y los cómodos planeos durante el vuelo.

Hábitat: se encuentra en pantanos, esteros, bordes de lagos o lagunas y ríos.

Distribución: en Colombia se encuentra en todo su territorio.



Familia: Threskiornithidae

Género: *Eudocimus*

Especie: *Eudocimus ruber*

Nombre Común: Corocora

Descripción: longitud entre 56 y 61 centímetros. Pico curvado, patas rosadas; piel facial desnuda, plumaje totalmente escarlata brillante.

Hábitat: pantanos de agua dulce, lagos y humedales.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Atlántico, Arauca, Casanare, Guajira y Meta.



Familia: Ardeidae

Género: *Cochlearius*

Especie: *Cochlearius cochlearius*

Nombre Común: Garza Pico Zapato

Descripción: longitud entre 46 y 51 centímetros. Es un ave fuerte y robusta, con ojos grandes oscuros y un pico en forma de zapato. Tiene una cresta larga y despeinada en la coronilla de color negro, que generalmente lleva escondida sobre su nuca. La frente y la garganta son blancas con tonos grisáceos en la cara, cuello y pecho. Las demás partes superiores son de color gris.

Hábitat: en manglares, lagunas salobres, pantanos y ríos.

Distribución: en Colombia se encuentra en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Chocó y Cundinamarca.



Familia: Ardeidae
Género: *Tigrisoma*
Especie: *Tigrisoma lineatum*
Nombre Común: Garza Tigre

Descripción: longitud entre 66 y 76 centímetros. Pico amarillento, patas verde opaco, cuello largo y grueso, cabeza y pecho castaños con una raya blanca a lo largo del cuello. Espalda y cola café. Las demás partes inferiores son de color café con bandas negras y blancas.

Hábitat: lagunas con vegetación, lagos de agua dulce y pantanos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Antioquia, Casanare y Magdalena.



ORDEN FALCONIFORMES



Familia: Cathartidae

Género: *Vultur*

Especie: *Vultur gryphus*

Nombre Común: Cóndor de los Andes

Descripción: longitud entre 102 y 130 centímetros. Alas grandes y anchas con una envergadura de tres metros; cabeza desnuda arrugada de tono rojizo opaco. Plumaje negro con un collar blanco de suave plumón en la base del cuello. Especie considerada a nivel global como casi amenazada (Bird Life International, 2000) y categorizada a nivel nacional como en peligro (Rodríguez-Mahecha & Orozco, 2002).

Hábitat: zonas de páramo, en grandes alturas entre los 1.800 y 4.000 metros de altitud.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena (Sierra Nevada) y Nariño.



Familia: Cathartidae
Género: *Sarcoramphus*
Especie: *Sarcoramphus papa*
Nombre Común: Buitre Real

Descripción: longitud entre 70 y 85 centímetros. Con una envergadura en las alas de casi dos metros. Cabeza y cuello desnudos con carúnculas naranja, amarillo y púrpura.

Hábitat: en las selvas, lugares de mucha vegetación, también en zonas semiáridas, terrenos pantanosos y en las llanuras cerca de los bosques. Se le ve volando sobre la copa de los árboles en las selvas y otros lugares donde hay árboles.

Distribución: en Colombia se le encuentra en los departamentos del Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Magdalena y Santander.



Familia: Pandionidae

Género: *Pandion*

Especie: *Pandion haliaetus*

Nombre Común: Águila Pescadora

Descripción: longitud entre 53 y 61 centímetros. Pico fuerte y ganchudo, tarsos largos y robustos. Cabeza y partes inferiores blancas; espalda, alas y cola negras.

Hábitat: en las costas, y en el interior alrededor de grandes ríos y lagos.

Distribución: en Colombia se encuentra en todo su territorio.



Familia: Accipitridae

Género: *Geranoaëtus*

Especie: *Geranoaëtus melanoleucus*

Nombre Común: Águila Real Paramuna

Descripción: longitud entre 61 y 69 centímetros. Águila robusta y grande, pico fuerte y ganchudo, patas amarillas, alas largas y muy anchas, cola corta y negra, partes superiores negro pizarra, garganta gris claro, partes inferiores blancas.

Hábitat: sobre cañones húmedos, bosques templados y bajo páramo.

Distribución: en Colombia, al oriente de los Andes, al sur de Cundinamarca, Parque Nacional Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Sumapaz, Sierra Nevada del Cocuy, Páramo de Güicán en Boyacá. Hacia el sur, en el Nevado del Ruiz, Volcán Puracé en el Cauca, Huila y Nariño.



Familia: Accipitridae

Género: *Buteo*

Especie: *Buteo magnirostris*

Nombre Común: Gavilán Caminero

Descripción: longitud entre 33 y 38 centímetros. Es de cola pequeña, y alas cortas. Ojos amarillos, garganta y pecho gris pardusco; abdomen con franjas de color canela y blanco. Cola gris con cuatro o cinco bandas blancas.

Hábitat: bosques secos y orillas de los ríos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Magdalena y Santander.



Familia: Falconidae
Género: *Polyborus*
Especie: *Polyborus plancus*
Nombre Común: Caracara

Descripción: longitud entre 56 y 61 centímetros. Pico fuerte de color rojo en la base, patas largas y amarillas. Piel facial desnuda, coronilla negra, cuello y garganta blancos, manto barrado negro y blanco, rabadilla y cola blancas con estrechas bandas onduladas negras, y amplia banda subterminal negra.

Hábitat: en terreno abierto o semiabierto, matorrales con árboles dispersos.

Distribución: en Colombia, en todo el territorio nacional, excepto en la Costa Pacífica y región de Urabá.



Familia: Falconidae

Género: *Falco*

Especie: *Falco rufigularis*

Nombre Común: Halcón Murcielaguero

Descripción: longitud entre 23 y 30 centímetros. Pequeño halcón oscuro con alas largas y agudas. Cera, órbitas y patas amarillas. Partes superiores y lados de la cabeza de color negro; garganta, pecho y lados del cuello blancos; partes inferiores de tono rufo; cola negra con franjas blancas.

Hábitat: común en zonas secas o húmedas; bordes de bosques, y claros con árboles altos.

Distribución: en Colombia es común verlo en los departamentos de Casanare, Caquetá, Magdalena y Santander.



Familia: Falconidae

Género: *Falco*

Especie: *Falco sparverius*

Nombre Común: Cernícalo

Descripción: longitud entre 23 y 28 centímetros. Pequeño, pico en forma de sierra con bandas negras en el lorum y alas aguzadas. Principalmente rufo por encima con barras negras, coronilla y alas azulosas; garganta y lados de la cabeza blancos.

Hábitat: a orillas de carreteras y terrenos abiertos con árboles dispersos o zonas boscosas, y zonas residenciales.

Distribución: en Colombia, en Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander y Vichada.



Familia: Falconidae

Género: *Micrastur*

Especie: *Micrastur semitorquatus*

Nombre Común: Halcón Collarejo

Descripción: longitud entre 38 y 61 centímetros. De color negruzco en el dorso y abdomen, collar estrecho en la nuca, pecho blanco con pintas café, cola negra con varias bandas blancas estrechas.

Hábitat: se le encuentra en los bordes de bosques tropicales lluviosos de tierras bajas; en bosque secundario especialmente con sotobosque denso, además en manglares.

Distribución: en Colombia, desde la Costa Pacífica hasta Caquetá, Meta y Nariño.



ORDEN OPISTHOCOMIFORMES



Familia: Opisthocomidae

Género: *Opisthocomus*

Especie: *Opisthocomus hoazin*

Nombre Común: Pava Hedionda

Descripción: longitud entre 61 y 66 centímetros. Es inconfundible por su apariencia prehistórica. El cuello y la cola son largos, presenta una cresta rufa, larga y rizada. El área ocular es desnuda, extensa y azul brillante. Los ojos son rojos. Dorso de color oliva, garganta y pecho amarillo pálido, nuca oliva con estrías blancas. Abdomen, flancos y muslos de color café.

Hábitat: se encuentra comúnmente en bancos ribereños cercanos a bosques; de hábito arborícola y lacustre.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Arauca, Casanare y Guainía.



ORDEN GALLIFORMES



Familia: Cracidae

Género: *Ortalis*

Especie: *Ortalis motmot columbiana*

Nombre Común: Guacharaca

Descripción: longitud 53 centímetros. Patas rojas, cabeza gris pálido, cuello y pecho de color café con barras blancas, vientre claro, cola larga, área malar desnuda y roja.

Hábitat: bosques húmedos, áreas claras con árboles dispersos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Casanare, Meta y Vaupés.



Familia: Odontophoridae
Género: *Colinus*
Especie: *Colinus cristatus*
Nombre Común: Perdiz

Descripción: longitud entre 20 y 23 centímetros. Cresta aguda, cara y garganta blanquecinas, nuca negra punteada de blanco, partes superiores café con pintas blancas, vientre castaño con puntos blancos grandes en el pecho y en los flancos.

Hábitat: tierras bajas y sabanas, más común en pastizales secos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander.



ORDEN CHARADRIIFORMES



Familia: Charadriidae

Género: *Vanellus*

Especie: *Vanellus chilensis*

Nombre Común: Alcaraván o Pellar

Descripción: longitud entre 30 y 35 centímetros. Pico rojo; cabeza con una cresta occipital larga y aguda de color negro, cuello y parte superior de la espalda grisáceos; pecho negro con lustre metálico, demás partes inferiores blancas; cola del mismo color del pecho, pero basalmente blanco y apicalmente marginada de blanco acanelado. Tarsos y dedos de tono rojo pálido, iris rojo.

Hábitat: común en pastizales, sabanas abiertas encharcadas.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta.



ORDEN GRUIFORMES




Familia: Rallidae
Género: *Porphyrio*
Especie: *Porphyrio martinica*
Nombre Común: Polla Azul

Descripción: longitud 20 centímetros. Pico rojo y verde claro hacia el ápice. Cabeza con coronilla azul clara; cuello y parte inferior del cuerpo azul violeta. Dorsal y cubiertas alares azul verdoso con brillo tornasolado. Punta de las alas y cola castaño verdoso. Tarsos y dedos largos amarillos.

Hábitat: regiones ribereñas y pantanosas, especialmente en zonas con abundante vegetación flotante, igualmente se le observa en áreas abiertas, potreros y rastrojos.

Distribución: en Colombia, en todo su territorio.



Familia: Rallidae
Género: *Aramides*
Especie: *Aramides cajanea*
Nombre Común: Chirlacoa

Descripción: longitud 38 centímetros. Pico moderadamente largo, amarillento en la base y verdoso en el extremo; anillo ocular desnudo; cabeza y cuello color gris, garganta más pálida, coronilla café, pecho y lados en tono rufo, abdomen y flancos cafés, rabadilla y cola negras; patas rojas, dorso y alas color café pálido.

Hábitat: común en selvas pantanosas, orillas de ríos, manglares y charcos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Casanare, Meta, Santander y Valle del Cauca.



Familia: Eurypygidae
Género: *Eurypyga*
Especie: *Eurypyga helias*
Nombre Común: Garza del Sol

Descripción: longitud entre 46 y 48 centímetros. Pico largo y recto, negro por encima y amarillo por debajo. Cabeza pequeña y negra con listas blancas encima y por debajo de los ojos; garganta blanca, resto del cuerpo y partes superiores café; coberteras alares punteadas de blanco, alas con parches brillantes rufo naranja.

Hábitat: en arroyos de selva y matorrales encharcados.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Casanare, Chocó, y Meta.



ORDEN PICIFORMES



Familia: Ramphastidae

Género: *Ramphastos*

Especie: *Ramphastos culminatus*

Nombre Común: Tucán Pecho Blanco

Descripción: longitud 48 centímetros. Pico grande y negro con base de la mandíbula superior y culmen amarillo pálido. Cuerpo principalmente negro con rabadilla anaranjada; abdomen rojo, garganta y pecho blancos bordeados por una estrecha banda roja.

Hábitat: principalmente bosque tropical de tierras bajas, especialmente viejos lechos de ríos, estadios tardíos de bosques sucesionales y bosque maduro cerca de cuerpos de agua.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Arauca, Meta, Nariño, Santander, Vaupés y Vichada.



Familia: Ramphastidae
Género: *Ramphastos*
Especie: *Ramphastos brevis*
Nombre Común: Tucán Pecho Amarillo

Descripción: longitud 48 centímetros. Pico amarillo y castaño; rabadilla blanca; abdomen rojo; garganta y pecho amarillos, bordeados por una estrecha banda blanca y roja. Área ocular desnuda de color verde amarillento.

Hábitat: bosques en tierras bajas, y en la parte baja de las laderas de las montañas, bosque nublado, parches de bosque, bordes, bosques secundarios viejos, claros de bosque y pantanos, bosques asociados a ríos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Magdalena, Meta y Santander.



Familia: Ramphastidae
Género: *Pteroglossus*
Especie: *Pteroglossus castanotis*
Nombre Común: Tucán Pili

Descripción: longitud 46 centímetros. Pico negro con una banda café amarillento en los lados de la mandíbula superior, más amplia y amarillenta en el ápice. Rabadilla roja y coronilla negra; garganta y lados de la cabeza castaño oscuro; las otras partes inferiores amarillas con una sola banda roja ancha a través del alto vientre; área ocular desnuda azul brillante.

Hábitat: es común encontrarla en bordes de selva húmeda, sabana de los Llanos.

Distribución: en Colombia, desde la base oriente de la Cordillera Oriental, cerca del extremo norte del Río Casanare y límite con Vaupés-Amazonas.



Familia: Ramphastidae

Género: *Andigena*

Especie: *Andigena nigrirostris*

Nombre Común: Tucán Pico Negro

Descripción: longitud 51 centímetros. Pico negro, coronilla y nuca negras; resto café oliva con rabadilla amarilla; cola negra con ápice castaño; garganta y lados de la cabeza blancos; resto de las partes inferiores gris azulado; abdomen rojo; área ocular desnuda azul.

Hábitat: bosque húmedo nublado, bosques montanos subtropicales a templados, bosques andinos, interior de bosque, bordes de bosque de niebla, matorrales, pantanos, áreas cultivadas aledañas a los bosques, áreas abiertas con árboles frutales esparcidos.

Distribución: en Colombia vuela en el Parque Nacional Natural de los Nevados y zonas aledañas, en los departamentos de Boyacá, Caquetá, Magdalena, Norte de Santander y Risaralda.



Familia: Ramphastidae

Género: *Aulacorhynchus*

Especie: *Aulacorhynchus prasinus albivitta*

Nombre Común: Tucancito Esmeralda

Descripción: longitud 33 centímetros. Pico negro con todo el borde superior de la mandíbula amarillo; garganta blanca. El cuerpo parcialmente verde brillante; área ocular azul; abdomen y ápice de las rectrices castaños.

Hábitat: vive en las selvas húmedas. Emplea los márgenes de la vegetación.

Distribución: en Colombia, Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá, Cordillera Oriental y vertiente oriente de la Cordillera Central.



Familia: Picidae

Género: *Dryocopus*

Especie: *Dryocopus lineatus*

Nombre Común: Carpintero real.

Descripción: longitud 36 centímetros. Pico negro; cabeza con la coronilla formada por un copete prominente de color rojo y uniforme, lados de la misma negros y con una lista blanca y angosta que se proyecta desde la base del pico, pasa por la región loreal y continúa por los lados del cuello hasta el pecho. Partes inferiores con la garganta blanca densamente listada de negro; parte superior del pecho e inferior del cuello negras; las demás partes inferiores con barras de colores café y negro.

Hábitat: bordes de selva, montes claros, tierras bajas y piedemonte.

Distribución: en Colombia, en todo su territorio.



ORDEN COLUMBIFORMES



Familia: Columbidae

Género: *Columba*

Especie: *Columba fasciata*

Nombre Común: Torcaza collareja

Descripción: longitud 36 centímetros. Pico y patas de color amarillo. Es grande y robusta, tiene cola ancha en forma de abanico. Su plumaje es gris, presenta una banda blanca en la nuca; cabeza y partes inferiores gris vináceo.

Hábitat: común en selva húmeda de alta montaña y en claros con árboles dispersos.

Distribución: en Colombia se encuentra en las tres cordilleras.



ORDEN PSITACIFORMES



Familia: Pssitacidae

Género: *Ara*

Especie: *Ara ararauna*

Nombre Común: Guacamaya Azul

Descripción: longitud 84 centímetros. Pico negro. Cola muy larga y aguda. Plumaje azul brillante por encima, y amarillo por debajo. Coberteras alares, y superficie inferior de la cola de color verde; garganta negra; lados de la cabeza desnudos y blancos con estrechas líneas de plumas negras.

Hábitat: común en selvas de galería y selvas de baja humedad.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Caquetá, Guainía, Magdalena y municipio de Puerto Inírida.



Familia: Psittacidae

Género: *Amazona*

Especie: *Amazona ochorcephala*

Nombre Común: Loro Real o Loro Hablador

Descripción: longitud 36 centímetros. Pico, tarsos y dedos de color pardo oscuro. Colorido general del cuerpo verde con la frente y parte media de la coronilla en amarillo.

Hábitat: selvas secas abiertas y bordes de selvas húmedas, selva de galería y sabanas con árboles dispersos en los Llanos.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Casanare, Chocó, Huila, Magdalena, Norte de Santander y Putumayo.



ORDEN CUCULIFORMES



Familia: Cuculidae

Género: *Piaya*

Especie: *Piaya cayana*

Nombre Común: Pájaro Santo, Pájaro Ardilla.

Descripción: longitud 43 centímetros. Pico amarillo verdoso más oscuro hacia la base. Color del cuerpo generalmente castaño rojizo, con la nuca y la parte superior del pecho teñido de castaño claro; parte inferior del pecho y abdomen grises. Cola larga con cinco listas blancas. Iris de color rojo.

Hábitat: común en selvas secas a muy húmedas, y áreas semiabiertas.

Distribución: en Colombia, en todo su territorio.



ORDEN STRIGIFORMES



Familia: Strigidae

Género: *Asio*

Especie: *Asio flammeus*

Nombre Común: Búho campestre

Descripción: longitud 36 centímetros. Diurno, de tamaño mediano con orejas. Ojos amarillos; casi todo el cuerpo de color café barreteado. Alas y cola barradas de café.

Hábitat: potreros, sabanas y páramo. Originalmente numeroso en sabanas de Bogotá.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Cauca, Cundinamarca y Nariño.



Familia: Strigidae

Género: *Megascops*

Especie: *Megascops choliba*

Nombre Común: Currucutú o Surnucuco

Descripción: longitud 23 centímetros. Búho pequeño con orejas. Pico y ojos amarillos; por encima café oscuro; coberteras alares y escapulares punteadas de blanco; partes inferiores de tono café claro.

Hábitat: regiones secas a húmedas, selvas secundarias altas y áreas residenciales.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander.



ORDEN CAPRIMULGIFORMES



Familia: Caprimulgidae

Género: *Chordeiles*

Especie: *Chordeiles minor*

Nombre Común: Gallina Ciega Migratoria

Descripción: longitud 23 centímetros. Partes superiores de color pardo grisáceo, moteadas de blanco y café; cola barreteada de negro y blanco; alas con una franja blanca en las rémiges primarias; garganta blanca.

Hábitat: borde de los caminos, hojarasca y pastizales.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Guajira, Huila, Magdalena y Valle.



ORDEN APODIFORMES



Familia: Trochilidae

Género: *Oxypogon Oxipogon*

Especie: *Oxypogon guerinii*

Nombre Común: Chivito de Páramo

Descripción: longitud 11 centímetros. Pico corto. Encima de la cabeza su color es verde oliva; cresta blanca y negra, larga y aguda; barba blanca con una estría central verde iridiscente. Amplio collar blanco en el cuello; cola larga ligeramente ahorquillada.

Hábitat: es común encontrarlo en los páramos.

Distribución: en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Oriental, Cordillera Central en los Nevados de Tolima y Quindío.



Familia: Trochilidae
Género: *Lesbia*
Especie: *Lesbia victoriae*
Nombre Común: Colibrí Cola Larga.

Descripción: longitud 25 centímetros. Pico relativamente corto. El macho es inconfundible: verde brillante, cola muy larga y negra, todas las rectrices con ápice verde bronce excepto las externas. Activo, agresivo y territorial.

Hábitat: común en pastizales enmalezados, cañadas y arbustos cerca del límite de vegetación arbórea; también vive en los setos, ocasionalmente en páramo abierto. Prefiere tierras altas y secas.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Santander.



ORDEN TROGONIFORMES



Familia: Trogonidae

Género: *Trogon*

Especie: *Trogon melanurus*

Nombre Común: Soledad Colinegra, Quetzal.

Descripción: longitud 33 centímetros. Pico amarillo, cuerpo con una estrecha banda pectoral blanca entre el verde del pecho y el rojo del vientre; cola negra.

Hábitat: selva húmeda y bosques de monte secundario.

Distribución: en Colombia se encuentra en áreas de Santa Marta y Valle del Magdalena.



ORDEN CORACIFORMES



Familia: Alcedinidae

Género: *Ceryle*

Especie: *Ceryle torquata*

Nombre Común: Martín Pescador Grande.

Descripción: longitud 38 centímetros. El mayor Martín Pescador en Colombia. Cresta deshilachada eréctil listada de negro; partes inferiores de tono gris azulado; garganta y lados del cuello blancos; resto de partes inferiores castaño rufo. La hembra es similar pero con amplia banda pectoral gris azulado, estrechamente bordeada por debajo de blanco.

Hábitat: común en la mayoría de cuerpos de agua dulce y en manglares.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Casanare y Santander



ORDEN PASERIFORMES



Familia: Cotingidae

Género: *Rupicola*

Especie: *Rupicola peruviana*

Nombre Común: Gallito de Roca.

Descripción: longitud 32 centímetros. Pico y patas anaranjados, ojos naranja; cresta en forma de disco desplegada. Plumaje del cuerpo naranja, alas negras; rémiges en gris perla, largas y anchas.

Hábitat: usualmente cerca de arroyos y ríos, en cañadas húmedas. Requiere de escarpes rocosos para anidar.

Distribución: en Colombia y en la vertiente Pacífica, cordillera Oriental y Occidental. Vale anotar que el Profesor Andrade colectó este ejemplar en el Cañón de Arcabuco, hace más de 30 años, y, hasta la fecha, esta especie ya no se observa volar en esta zona.



Familia: Traupidae

Género: *Anisognatus*

Especie: *Anisognatus igniventris*

Nombre Común: Clarinero Escarlata

Descripción: longitud 19 centímetros. Predomina el negro intenso, aunque su pecho y abdomen son rojos. Los hombros y la rabadilla son de color azul celeste. Vive en parejas y se desliza silencioso en setos densos, potreros y arbustos.

Hábitat: usualmente en potreros con árboles dispersos y en parches remanentes de bosque enano y arbustos.

Distribución: en Colombia se encuentra en los departamentos de Boyacá, Caldas, Cundinamarca y Nariño.



Familia: Traupidae

Género: *Anisognathus*

Especie: *Anisognathus flavinucha*

Nombre Común: Clarinero Primavera

Descripción: longitud 19 centímetros. La frente y los lados de la cabeza son negros; amplia lista desde la coronilla hasta la nuca, y todas las partes inferiores en amarillo dorado brillante; el resto, principalmente negro por encima con parche azul en los hombros.

Hábitat: común en bordes de selva húmeda, especialmente bosque enano de zona templada hasta límite de vegetación arbórea, páramo.

Distribución: en Colombia se le encuentra en el extremo norte de la Cordillera Occidental, Paramillo; en los dos flancos de la cordillera Central, y la vertiente oeste de la cordillera Oriental en Santander.



Familia: Traupidae

Género: *Buthraupis*

Especie: *Buthraupis montana*

Nombre Común: Azulejo Real

Descripción: longitud 23 centímetros. Grande, ojos rojos, cabeza y garganta negras; el resto del cuerpo es azul intenso, y las partes inferiores son de tono amarillo dorado. Estrecha banda azul en los lados de la rabadilla; tibias negras.

Hábitat: medianamente en selva húmeda, a veces en montes secundarios y áreas parcialmente deforestadas.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander.



Familia: Corvidae

Género: *Cyanocorax*

Especie: *Cyanocorax yncas*

Nombre Común: Urraca

Descripción: longitud 32 centímetros. Ojos amarillos. Corta cresta frontal y base del pico azul; lados de la cabeza, garganta, y pecho de color negro; vientre y flancos amarillos; coronilla y nuca de color blanco azulado; partes superiores y cola en tono verde brillante; rectrices externas amarillas.

Hábitat: común en bosque húmedo, en los bordes de los bosques secundarios altos, y en árboles en claros.

Distribución: en Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander.